



## 璽寶產後護理之家-衛教單張

### 預防接種的項目及副作用

適合接種年齡	疫苗種類	接種反映
出生 24 小時內儘速接種	<ul style="list-style-type: none"> <li>●B 型肝炎免疫球蛋白一劑</li> <li>●B 型肝炎遺傳工程疫苗第一劑</li> </ul>	少部分的人在注射部位有紅腫現象，不過一、兩天內即會自動消失。
出生滿 1 個月 出生滿 2 個月	B 型肝炎遺傳工程疫苗第二劑  <ul style="list-style-type: none"> <li>●五合一疫苗(白喉破傷風非細胞性百日咳</li> <li>●b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)第一劑</li> <li>●13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗第一劑</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●接種後 1-3 天可能發生注射部位紅腫、酸痛，偶爾有哭鬧不安、疲倦、食慾不振或嘔吐等症狀，通常 2-3 天後會恢復。</li> <li>●極少部分的人可能注射部位有紅腫現象，或者出現輕微發燒。</li> <li>●發燒、不安、注射部位紅斑、硬塊/腫脹或疼痛/觸痛、睡眠時間增加或減少。</li> </ul>
出生滿 4 個月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●五合一疫苗(白喉破傷風非細胞性百日咳、</li> <li>●b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)第二劑</li> <li>●13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗第二劑</li> </ul>	
出生滿 5-8 個月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●卡介苗一劑</li> </ul>	接種後 7-14 天在接種部位有紅色小結節，紅色小結節 6 逐漸長大微有癢，4-6 週可變成膿泡或潰瘍，不可擠壓或包紮，只要保持清潔，用無菌紗布或棉擦拭即可，經 2-3 個月潰瘍自然癒合，有時同側腋窩淋巴腺會腫大，如果接種部位腫脹厲害有

		感染情形時，則請醫師檢查。
出生滿 6 個月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●B 型肝炎遺傳工程疫苗第三劑</li> <li>●五合一疫苗(白喉破傷風非細胞性百日咳、</li> <li>●b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)第三劑</li> </ul>	
出生滿 12~15 個月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗第三劑</li> </ul>	
出生滿 12 個月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第一劑</li> <li>●水痘疫苗一劑</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●局部反應很少，接種後 5-12 天，偶有疹子、咳嗽、鼻炎或發燒等症狀。</li> <li>●極少數有發燒情形。</li> </ul>
出生滿 15 個月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●日本腦炎疫苗第一劑、第二劑(間隔兩週)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●注射部位偶有紅腫疼痛，2~3 天自然改善。</li> </ul>
出生滿 18 個月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●五合一疫苗(白喉破傷風非細胞性百日咳</li> <li>●b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗)第四劑</li> </ul>	
出生滿 27 個月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●日本腦炎疫苗第三劑</li> </ul>	
滿 5 歲至入學前	<ul style="list-style-type: none"> <li>●減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗一劑</li> <li>●麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗第二劑</li> <li>●日本腦炎疫苗第四劑</li> </ul>	

107 年 10 月 制定